



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍ

CARGO

E NFERMEIRO

5-3-2023

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação 5 questões

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

- Com relação aos tipos de choque, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
 - O choque anafilático é causado por uma grave reação alérgica quando pacientes que já produziram anticorpos contra uma substância estranha (antígeno) são subsequentemente expostos ao antígeno e, em seguida, desenvolvem uma reação antígeno-anticorpo sistêmica: especificamente, uma resposta mediada por IgE.
 - Um dos manejos utilizados no choque séptico é o monitoramento de sinais e sintomas como alteração do estado mental, temperatura subnormal ou elevada, pele fria e pegajosa, débito urinário, hipotensão, taquicardia, outras arritmias, distúrbios eletrolíticos, taquipneia e valores anormais da gasometria arterial.
 - O choque hipovolêmico, que é o tipo mais comum, caracteriza-se por volume intravascular diminuído. Não pode ser causado por perdas hídricas internas, como na perda de sangue traumática, ou por deslocamento interno de líquido, como na desidratação grave, edema grave ou ascite.As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:
 - V – V – V
 - F – F – V
 - F – V – V
 - V – V – F
- Com relação às manifestações clínicas e manejo frente ao infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa incorreta.
 - As metas do manejo clínico consistem em minimizar a lesão do miocárdio, preservar a função miocárdica e evitar complicações, como arritmias letais e choque cardiogênico.
 - O paciente pode apresentar uma combinação de sintomas, incluindo dor torácica, falta de ar, indigestão, náuseas e ansiedade.
 - O paciente pode ter pele fria, pálida e úmida; a frequência cardíaca e a frequência respiratória podem ser mais lentas do que o padrão normal. Esses sinais e sintomas são causados pela estimulação do sistema nervoso parassimpático.
 - O manejo inicial inclui oferta de oxigênio suplementar, ácido acetilsalicílico, nitroglicerina e morfina.
- Marque a resposta certa de acordo com a proposição abaixo:

São fatores de risco para o acidente vascular encefálico hemorrágico, exceto o item da alternativa:

 - Idade avançada (acima de 55 anos).
 - Hipertensão arterial.
 - Consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
 - Diabetes Mellitus.



4. O aneurisma intracraniano é a dilatação das paredes de uma artéria cerebral, conseqüente à fraqueza da parede arterial. Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
- () A causa do aneurisma intracraniano não é conhecida; porém ele pode ser decorrente de aterosclerose, defeito congênito da parede vascular, doença vascular hipertensiva, traumatismo cranioencefálico ou idade avançada.
 - () A prevenção primária consiste em manejo da hipertensão.
 - () Alguns diagnósticos de enfermagem, que podem ser elencados no caso de aneurisma intracraniano, são: perfusão tissular (cerebral) ineficaz, relacionada com sangramento ou vasospasmo, e alteração da percepção sensorial, relacionada com as restrições impostas pelas precauções do aneurisma.

As afirmativas, de acordo com a ordem apresentada, de cima para baixo, correspondem correta e respectivamente à seqüência das letras da alternativa:

- A.() V – V – V
 - B.() F – F – V
 - C.() F – V – V
 - D.() V – V – F
5. Com base no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, em quantas doses a vacina contra Rotavírus humano G1P1 (VRH) deve ser administrada em crianças?
- A.() Dose única: 2 meses de vida.
 - B.() Uma dose e um reforço: 2 meses e 6 meses de vida.
 - C.() Dose única: 4 meses de vida.
 - D.() Duas doses: 2 meses e 4 meses de vida.
6. Com relação ao tratamento de corrimento vaginal e cervicite, considere as informações do quadro abaixo, relacionando a segunda coluna de acordo com os dados da primeira coluna.

Agente causador	Tratamento
I. Gonorreia e Clamídia - Infecção gonocócica NÃO complicada (uretra, colo do útero, reto e faringe).	() Ceftriaxona 1g IM ou IV ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento, MAIS Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
II. Candidíase vulvovaginite – primeira opção.	() Fluconazol 150mg, VO, dose única, OU Itraconazol 100mg, 2 comprimidos, VO, 2x/dia, por 1 dia.
III. Gonorreia e Clamídia - Infecção gonocócica disseminada.	() Miconazol creme a 2% ou outros derivados imidazólicos, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias, OU Nistatina 100.000 UI, uma aplicação, via vaginal, à noite ao deitar-se, por 14 dias.
IV. Candidíase vulvovaginite – segunda opção.	() Ceftriaxona 500mg, IM, dose única, MAIS Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única.

A seqüência correta da numeração, considerando a correspondência entre o agente causador e respectivo tratamento, está descrita, de cima para baixo, na alternativa:

- A.() III, II, I e IV
- B.() III, IV, II e I
- C.() I, II, III e IV
- D.() II, I, IV e III



7. No que se refere aos cuidados com a gestante na atenção primária à saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale com (V) caso seja(m) verdadeira(s) e com (F) caso seja(m) falsa(s).
- () A captação da gestante para o acompanhamento deve ser precoce – dentro do primeiro trimestre da gestação –, possibilitando a identificação de eventuais fatores de risco e instituindo os cuidados do pré-natal.
 - () O acesso à unidade, para a mulher que busca a confirmação da gravidez, deve ser sempre aberto, com fluxos ágeis, evitando adiar a realização dos testes. A confirmação, por meio da avaliação clínica ou do Teste Rápido de Gravidez, deve ser feita com discrição e respeito à mulher, sendo esta uma ocasião para o conhecimento de sua situação e o início das orientações e cuidados.
 - () É assegurado à gestante o direito de levar um acompanhante de sua escolha nas consultas (companheiro, mãe, amiga ou outra pessoa). Sabe-se que a presença do companheiro ou parceiro na primeira consulta traz significativo diferencial qualitativo ao atendimento.
 - () O enfermeiro e o médico da equipe devem se alternar nas consultas subsequentes, mas com a atenção para uma gestão integrada do cuidado de cada gestante e do grupo de gestantes. A atuação interdisciplinar é favorecida pela discussão de casos, pelo apoio recíproco nas ações de cuidado e pelo planejamento junto das intervenções.

As afirmativas, de acordo com a ordem apresentada, correspondem correta e respectivamente à alternativa:

- A.() V – V – V – V
 - B.() F – F – V – V
 - C.() F – V – V – V
 - D.() V – V – F – F
8. São recomendações da parametrização, para a distribuição dos atendimentos durante gestação e puerpério, as contidas corretamente na alternativa:
- A.() Atendimentos mensais até a 26ª semana; atendimentos quinzenais da 26ª até a 37ª semana; atendimentos semanais da 37ª semana até o parto e nascimento.
 - B.() Atendimentos mensais até a 20ª semana; atendimentos quinzenais da 20ª até a 36ª semana; atendimentos semanais da 36ª semana até o parto e nascimento.
 - C.() Atendimentos mensais até a 22ª semana; atendimentos quinzenais da 22ª até a 38ª semana; atendimentos semanais da 38ª semana até o parto e nascimento.
 - D.() Atendimentos mensais até a 28ª semana; atendimentos quinzenais da 28ª até a 36ª semana; atendimentos semanais da 36ª semana até o parto e nascimento.
9. Os imunobiológicos são produtos farmacológicos produzidos a partir de micro-organismos vivos, subprodutos ou componentes, capazes de imunizar de forma ativa ou passiva. São produtos termolábeis, sensíveis ao calor, ao frio e à luz. Assim, de forma a manter sua potência, devem ser armazenados, transportados, organizados, monitorados, distribuídos e administrados adequadamente. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir e assinale com (V) a(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s).
- () O Programa Nacional de Imunização, atualmente, disponibiliza 42 imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas, conforme disponível no Sistema de Informação de Insumos Estratégicos.
 - () Quando há evidência comprovada de que a vacina foi submetida a uma variação da temperatura de conservação, diferente da preconizada pelo produtor (descrita na bula), a OMS orienta determinados procedimentos específicos para análise da estabilidade das vacinas utilizadas nos programas de imunização, destacando situações de exposição a altas temperaturas e a temperaturas de congelamento.
 - () O transporte dos imunobiológicos entre a Instância Regional/Municipal para a Local é feito somente à temperatura positiva. São utilizadas caixas térmicas, com bobinas reutilizáveis ambientadas, visando assegurar a temperatura de conservação dos imunobiológicos, sendo necessário o monitoramento contínuo da temperatura no interior das caixas durante todo o processo de transporte da carga.

As afirmativas, na ordem apresentada, correspondem correta e respectivamente à alternativa:

- A.() V – V – F
- B.() F – F – V
- C.() V – V – V
- D.() F – V – F



10. Nas seguintes situações o aleitamento materno não deve ser recomendado, exceto:
- A. () Mães infectadas pelo HIV.
 - B. () Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).
 - C. () Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação.
 - D. () Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.
11. A tuberculose (TB) pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB na forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença.
- Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
- () Classicamente, as principais formas de apresentação da TB são a forma primária, a pós-primária (ou secundária) e a miliar. Os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, podem ocorrer em qualquer das três apresentações.
 - () A TB pulmonar primária normalmente ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo e, por isso, é mais comum em crianças. As manifestações clínicas podem ser insidiosas, com o paciente apresentando-se irritadiço, com febre baixa, sudorese noturna e inapetência. Nem sempre a tosse está presente.
 - () A TB pulmonar pós-primária ou secundária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva.
 - () A baciloscopia de escarro é indicada nas seguintes condições: no sintomático respiratório, durante estratégia de busca ativa; em caso de suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse; para acompanhamento e controle de cura em casos pulmonares com confirmação laboratorial.
 - () Quando a leitura do resultado de baciloscopia de escarro for “Não são encontrados BAAR em 100 campos observados”, interpreta-se que o resultado é negativo.
 - () A estrutura mínima recomendada na Unidade de Referência secundária para TB é equipe com profissional médico especialista ou com experiência no tema, enfermeiro e técnico de enfermagem, farmacêutico ou pessoa com capacidade para a gestão dos medicamentos.
- As afirmativas, na ordem apresentada, correspondem correta e respectivamente à sequência da alternativa:
- A. () V – V – F – F – F – F
 - B. () F – F – V – V – F – F
 - C. () V – V – V – V – V – V
 - D. () F – V – F – V – V – V
12. A Lei nº 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências em seu artigo nº 8 refere que: “As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja diretamente ou mediante participação _____ da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente”.
- Assinale a alternativa que contém a palavra que preenche correta e adequadamente o espaço da afirmação acima, de acordo com o artigo supracitado.
- A. () parcial
 - B. () complementar
 - C. () voluntária
 - D. () unitária

13. Uma das atribuições do enfermeiro é a coleta do material para o exame citopatológico do colo do útero. Analise as afirmativas a seguir e assinale com (V) a(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s).
- () Segundo a Organização Mundial da Saúde, o limite máximo de amostras insatisfatórias esperado é de 5% do total de exames realizados.
 - () Para a realização da coleta de material para o exame citopatológico do colo do útero, o espécuro deve ser introduzido suavemente, em posição vertical e ligeiramente inclinado de maneira que o colo do útero fique exposto completamente, o que é imprescindível para a realização de uma boa coleta. Iniciada a introdução, deve-se fazer uma rotação deixando-o em posição transversa, de modo que a fenda da abertura do espécuro fique na posição horizontal.
 - () Após a introdução completa do espécuro na vagina, deve-se abrir lentamente e com delicadeza. Na dificuldade de visualização do colo, não deve ser sugerido à mulher para tossir.
 - () A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina única. A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois o material coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico oncótico.
 - () O esfregaço obtido deve ser imediatamente fixado para evitar o dessecamento do material. Na fixação com álcool a 96%, considerada mundialmente como a melhor para os esfregaços citológicos, a lâmina deve ser colocada dentro de frasco com álcool em quantidade suficiente para que todo o esfregaço seja coberto e o recipiente deve ser cuidadosamente fechado e envolvido com a requisição. Na fixação com spray de polietilenoglicol, borrifa-se a lâmina, que deve estar em posição horizontal, imediatamente após a coleta, com o spray fixador, a uma distância máxima de 10cm.

As afirmativas, na ordem apresentada, correspondem correta e respectivamente à sequência da alternativa:

- A.() V – V – F – F – F
 - B.() F – F – V – V – F
 - C.() V – V – F – V – V
 - D.() V – V – F – V – F
14. No rastreamento do câncer de mama, os exames têm como finalidade detectar a doença precocemente, para permitir tratamento menos radical, melhorar a qualidade de vida, reduzir as taxas de mortalidade e morbidade e reduzir gastos no tratamento. As principais indicações da ultrassonografia de mamas como método diagnóstico são as descritas a seguir, exceto a da alternativa:
- A.() Diagnóstico diferencial entre lesão sólida e lesão cística.
 - B.() Alterações no exame físico (lesão palpável), no caso de mamografia negativa ou inconclusiva.
 - C.() Na jovem com lesão palpável.
 - D.() Avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante.
15. Com relação às coberturas para tratamento de feridas citadas na primeira coluna, considere as indicações dispostas na segunda coluna e estabeleça a correta correlação entre elas.

Cobertura	Indicação
I. Ácidos graxos essenciais (AGE)	() Prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas.
II. Hidrocoloide	() Feridas exsudativas, com ou sem sangramento, cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção.
III. Alginato de cálcio	() Prevenção de úlceras de pressão e tratamento de feridas abertas.
IV. Sulfadiazina de prata	() Queimaduras, lesões infectadas ou com tecido necrótico.

A sequência da cobertura, correspondente à indicação, está descrita corretamente, de cima para baixo, na alternativa:

- A.() IV, III, I e II.
- B.() III, I, II e IV.
- C.() I, II, III e IV.
- D.() II, III, I e IV.



16. Quanto às atribuições do enfermeiro da atenção básica, em relação ao Programa Saúde na Escola, estão certas as alternativas a seguir, com exceção da alternativa:
- A. () Realizar avaliação clínica e psicossocial.
 - B. () Realizar aferição da pressão arterial dos escolares e encaminhar ao médico da equipe quando o exame resultar alterado.
 - C. () Ser articulador da comunidade junto às instâncias de atenção à saúde e também de controle social da saúde e da educação, visando a sensibilizar a comunidade na busca de respostas aos problemas mais frequentes apresentados pela população escolar.
 - D. () Monitorar, notificar e orientar escolares, pais e professores diante de efeitos adversos vacinais.
17. A Resolução nº 564 de 2017, do Conselho Federal de Enfermagem, que aborda o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em seu Artigo 108 menciona que “as penalidade a serem impostas pelo Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: I – Advertência verbal; II – Multa; III – Censura; IV – Suspensão do Exercício profissional; e V – Cassação do direito ao exercício profissional.” No parágrafo nº 4 é dito que “a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até _____ dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores”.
- Assinale abaixo a alternativa que preenche correta e adequadamente o espaço da frase, em conformidade com a Resolução supracitada.
- A. () 30
 - B. () 60
 - C. () 90
 - D. () 120
18. Para avaliação física do paciente adulto, o enfermeiro realiza o exame físico por meio de técnicas. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
- () Quando possível, o exame físico deve começar com o paciente sentado, para que tanto a parte anterior quanto a posterior do corpo possam ser examinadas.
 - () Durante a palpação de extremidades (membros superiores e inferiores), pode ser percebido um edema, que geralmente é graduado de 1 até 3+ ou 4+ (cruzes). O edema 1+ corresponde à ligeira depressão que desaparece em pouco tempo. Grau 3+ ou 4+ é uma depressão profunda, que não desaparece prontamente.
 - () A ausculta abdominal deve ser realizada antes da percussão e da palpação abdominal, porque a palpação pode alterar o caráter dos sons intestinais.
 - () Na ausculta abdominal deve ser observada a frequência e o caráter dos murmúrios vesiculares intestinais (intensidade, duração).

As afirmativas, de acordo com a ordem apresentada, de cima para baixo, correspondem correta e respectivamente à alternativa:

- A. () V – V – F – V
- B. () F – F – V – F
- C. () V – V – V – F
- D. () V – V – V – V



19. Enfermagem perioperatória é o termo utilizado para descrever os cuidados de enfermagem prestados ao paciente durante todas as fases da experiência cirúrgica: pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
- () Fase pré-operatória – estende-se do momento em que é tomada a decisão de se fazer uma intervenção cirúrgica até a transferência do paciente para a sala de cirurgia.
 - () Fase intraoperatória – estende-se do momento em que o paciente é recebido na sala de cirurgia até ser admitido na unidade de recuperação pós-anestésica (URPA).
 - () Urgente – a condição requer intervenção cirúrgica imediata, sem demora (por exemplo, em caso de obstrução intestinal). A cirurgia deve ser realizada para salvar a vida, um membro ou a capacidade funcional.
 - () Cirurgia eletiva – o momento estipulado para a cirurgia é conveniente ao paciente; caso a cirurgia seja postergada, não ocorrem complicações catastróficas (por exemplo, cisto superficial).
 - () A cirurgia ambulatorial (comumente denominada cirurgia-dia) é uma intervenção comum para certos tipos de procedimentos. O enfermeiro encontra-se em posição privilegiada para avaliar as condições clínicas do paciente, planejar a experiência peroperatória e monitorar, educar e avaliar o paciente.

As afirmativas, de acordo com a ordem apresentada, de cima para baixo, correspondem correta e respectivamente à sequência das letras da alternativa:

- A.() V – V – F – V – V
 - B.() F – F – V – F – V
 - C.() V – V – V – F – F
 - D.() V – V – V – V – V
20. A hipotermia é uma condição na qual a temperatura central (interna) do corpo é inferior a 35°C como resultado da exposição ao frio ou da perda de termorregulação. Em resposta a uma diminuição da temperatura central, o organismo tentará produzir ou conservar mais calor: por tremores/calafrios, que produzem calor por meio da atividade muscular; por vasoconstrição periférica, para diminuir a perda de calor; e também pelo aumento da taxa metabólica basal. Com base na descrição acima e nos procedimentos do profissional enfermeiro em casos de hipotermia, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s).
- () Monitore continuamente a temperatura central com um termômetro retal.
 - () Manuseie o paciente com cuidado e delicadeza para evitar arritmias.
 - () O débito urinário pode aumentar em resposta à vasoconstrição periférica – diurese do frio.
 - () Avalie a circulação do paciente. Se a temperatura do corpo cair abaixo de 30°C, as bulhas cardíacas podem não ser audíveis, mesmo que o coração ainda esteja batendo. Os tecidos conduzem mal o som a baixas temperaturas.

As afirmativas, na ordem apresentada, correspondem correta e respectivamente à sequência das letras da alternativa:

- A.() V – V – F – V
- B.() F – F – V – F
- C.() V – V – V – F
- D.() V – V – V – V

21. O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Estudos epidemiológicos sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular. Também está associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem como de neuropatias (BRASIL, 2013). Nesse sentido, essas complicações do DM podem ser classificadas em complicações agudas e crônicas. Portanto, marque a alternativa abaixo que define essas complicações.
- A.() No DM as complicações agudas se referem àquelas adquiridas ao longo do tempo, como ganho de peso e obesidade precoce.
 - B.() No DM as complicações agudas mais frequentes são a hiperglicemia, ganho de peso e muita fome.
 - C.() No DM as complicações agudas mais frequentes são a hipoglicemia e cetoacidose; já as crônicas são a retinopatia, nefropatia e neuropatia diabéticas.
 - D.() No DM as complicações agudas e crônicas são mais frequentes em indivíduos que têm a doença compensada; portanto, não alteram o seu cotidiano.
22. Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus (DM), as úlceras de pés (também conhecidas como pé diabético) e a amputação de extremidades são as mais graves e de maior impacto socioeconômico (BRASIL, 2013). A partir dessa afirmativa, torna-se fundamental a atuação da equipe de saúde na Atenção Básica, no sentido de avaliar os pés de adultos com DM e fazer a classificação do risco de complicações nas extremidades. A prevenção, por meio do exame frequente dos pés de pessoas com DM, realizado pelo médico ou pela enfermeira da Atenção Básica, é de vital importância para a redução das complicações. O estímulo ao autocuidado faz parte das ações de prevenção de úlcera e lesões nos pés. Portanto, o enfermeiro que atua na atenção básica deverá avaliar o potencial para o autocuidado e precisará observar alguns aspectos.
- Nesse sentido, analise os itens a seguir em relação aos cuidados com os pés e, na sequência, marque a alternativa correta.
- I. Avaliar o conhecimento do paciente sobre o diabetes e avaliar o conhecimento sobre os cuidados com os pés e as unhas (complicações agudas e crônicas de fácil identificação).
 - II. Avaliar o comportamento do paciente com relação aos seus pés e avaliar o cuidado executado pela pessoa.
 - III. Avaliar o apoio familiar no cuidado com os pés e avaliar as condições dos calçados e das palmilhas.
- A.() Somente os itens I e II estão corretos.
 - B.() Somente os itens I e III estão corretos.
 - C.() Somente os itens II e III estão corretos.
 - D.() Os itens I, II e III estão corretos.
23. As doenças crônicas não transmissíveis têm aumentado sua prevalência nos últimos anos no Brasil. Muitos fatores têm contribuído substancialmente nesse sentido, tanto em relação ao estilo de vida ou à falta de atividade física. Por isso, para quem atua na atenção básica, é fundamental a organização da Linha de Cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), com o intuito de fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa doença, por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção (BRASIL, 2013).
- Considerando a importância desses aspectos acima referidos, marque a alternativa correta quanto à definição para a organização supracitada.
- A.() Não é necessário desenhar o itinerário terapêutico dos usuários na rede e relacionar as necessidades logísticas e de apoio; isso se faz com o tempo de atendimento.
 - B.() Faz-se necessário identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema de apoio (diagnóstico, terapêutico, assistência farmacêutica e sistema de informação), pontuando o que já existe e o que necessita ser pactuado com a gestão municipal/distrital/regional/estadual.
 - C.() Não é necessário identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema de apoio (diagnóstico, terapêutico, assistência farmacêutica e sistema de informação), devendo ser pontuado o que já existe e o que necessita ser pactuado com a gestão municipal/distrital/regional/estadual.
 - D.() Definir metas e indicadores, que serão utilizados para monitoramento e avaliação das Linhas de Cuidado, é uma tarefa da equipe médica.

24. A consulta de enfermagem é uma prática e uma estratégia de cuidado fundamental para a atuação do enfermeiro nas unidades básicas de saúde. Ela está ligada ao processo educativo e deve motivar a pessoa em relação aos cuidados necessários para a manutenção de sua saúde. Na prática, representa importante instrumento de estímulo à adesão às ações na Atenção Básica e tem sido fundamental no acompanhamento de pessoas com pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial sistêmica (HAS), sensibilizando-as sobre a sua condição de saúde e pactuando com elas metas e planos de como seguir o cuidado (BRASIL, 2013). Mediante essa afirmativa, marque a alternativa abaixo que expressa o papel da consulta de enfermagem para a prevenção primária da HAS.
- A. () A prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros.
- B. () A prevenção secundária da HAS pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros.
- C. () A prevenção terciária da HAS pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros.
- D. () A prevenção primária da HAS não pode ser realizada no âmbito da atenção básica, pois requer uma série de outros fatores para melhor atender o usuário.
25. Sabe-se que os acidentes fazem parte da rotina dos trabalhadores de saúde que atuam tanto no âmbito da atenção básica quanto da atenção hospitalar; portanto, quando os mesmos acontecem devem ser notificados. Sendo assim, podemos afirmar que todos os casos confirmados de acidentes de trabalho com exposição a material biológico devem ser registrados na Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Essa confirmação do acidente com exposição a material biológico com o trabalho (caso confirmado) pode ser feita por qualquer profissional de saúde, não sendo exclusividade médica (BRASIL, 2019). Além da Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico do SINAN, devem ser preenchidas as fichas individuais específicas de cada agravo de notificação compulsória na suspeita ou confirmação de casos de doenças infecciosas, tais como as descritas corretamente na alternativa:
- A. () Tuberculose, esquistossomose, leptospirose e doença pulmonar obstrutiva crônica.
- B. () Tuberculose, esquistossomose, leptospirose e diabetes Mellitus.
- C. () Tuberculose, esquistossomose, leptospirose, hepatites virais, meningite e HIV.
- D. () Tuberculose, esquistossomose, leptospirose, doença cardíaca e hipertensão arterial sistêmica.

Legislação

26. O Artigo 8º da Lei Orgânica do município de Entre-Ijuís trata das competências do município, no exercício de sua autonomia administrativa. Dentre as competências arroladas abaixo, assinale com V a(s) verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s). Após, marque a alternativa que corresponde à sequência correta das letras.
- () Legislar sobre assuntos de interesse local.
- () Organizar-se administrativamente tomando como exemplo a legislação de outros municípios de igual porte.
- () Organizar os quadros e estabelecer o Regime Jurídico de seus Servidores.
- () Legislar sobre os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso particular.
- A. () V – V – F – F.
- B. () V – F – V – F.
- C. () F – F – V – V.
- D. () F – V – F – V.



27. Pela Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais que visem à redução do risco de doenças. O município integra, com a União e o Estado, com recurso da seguridade social, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, cujas ações e serviços públicos na sua circunscrição territorial são por ele dirigidos, com as seguintes diretrizes:
- I. Atendimento integral, com prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.
 - III. É vedada ao Município a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- Após a análise das afirmativas supra, marque a única alternativa correta.
- A. () Estão corretas somente as afirmativas I e II.
 - B. () Estão corretas somente as afirmativas I e III.
 - C. () Todas as afirmativas estão incorretas.
 - D. () Todas as afirmativas estão corretas.
28. Com referência ao novo plano de cargos e salários (Lei 3.610/2022), leia as afirmativas abaixo colocando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). Na sequência, marque a alternativa correspondente à ordem correta das letras.
- () O plano instituído por essa Lei obedece em parte ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos estabelecido no âmbito municipal, e aplicam-se àqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo do Município, excetuados os ocupantes do Quadro de Servidores da Saúde, disciplinado em Lei específica.
 - () O sistema de carreiras no Serviço Público Municipal atenderá às diretrizes estabelecidas pelo presente diploma legal, oportunizando aos seus membros condições de desenvolvimento e qualificação profissionais, em consonância com os princípios e fins da administração pública municipal.
 - () O quadro de cargos e funções do Poder Executivo Municipal é integrado por:
 - I. quadro dos cargos de provimento efetivo, constituído por três grupos: cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível superior;
 - II. quadro de gratificações;
 - III. quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
 - () De acordo com a Lei supracitada, entende-se como cargo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo, retribuição pecuniária padronizada, escolaridade e carga horária.
- A. () V – V – F – F.
 - B. () F – V – V – V.
 - C. () F – V – F – V.
 - D. () F – F – V – V.



29. Conforme os artigos 39/40 do Plano de Cargos e Salário da Prefeitura de Entre-Ijuís, o programa de qualificação dos servidores municipais, titulares de cargos de provimento efetivo e em comissão tem como objetivo promover a sua capacitação e aperfeiçoamento, visando a um melhor desempenho de suas funções.

Para a implementação desse programa a Administração Municipal:

- I. Oportunizará treinamentos, seminários e congressos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
- II. Autorizará ou determinará o afastamento do servidor, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de treinamentos, seminários e congressos realizados nas suas respectivas áreas de atuação.
- III. Auxiliará na aquisição de livros e materiais necessários para a qualificação dos servidores, desde que existente pertinência entre o tema e as funções que exerce o servidor.
- IV. Auxiliará nas despesas com transporte, estadia e alimentação, quando for o caso, nos moldes definidos em lei específica.

Após a análise das afirmativas supra, marque a alternativa que representa a resposta certa.

- A. () Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
 - B. () Estão corretas somente as afirmativas I e II.
 - C. () Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
 - D. () Nenhuma das afirmativas está correta.
30. Sobre o Meio Ambiente, a Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís assim se manifesta:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Diante da afirmativa supra, marque a única alternativa incorreta, de acordo com a proposição a seguir. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município, supletivamente à União e ao Estado, entre outras:

- A. () Definir, em lei complementar, os espaços territoriais do Município e seus componentes a serem especialmente protegidos, e a forma da permissão para alteração e supressão, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
- B. () Promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente.
- C. () Incentivar e apoiar as manifestações comunitárias e de entidades de caráter científico, cultural, educacional e recreativo, com finalidades ecológicas.
- D. () Explorar recursos minerais, inclusive extração de areia, cascalho ou pedreiras, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente, na forma da lei.