



CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍ

CARGO

**M**ÉDICO PEDIATRA

5.3.2023

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação ..... 5 questões

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



## **C**onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Considere o quadro descrito abaixo:  
Lactente de 3 meses de vida nasceu de parto cesárea eletiva, 39 semanas, pesando 3400g, mãe com pouca produção de leite materno desde o parto, usa atualmente fórmula infantil artificial, levado ao pronto atendimento por ter apresentado sangramento nas fezes (raias de sangue). Ao exame físico, demonstrou bom estado geral, ativo, hidratado, abdome um pouco distendido com hipertimpanismo. Vacinas em dia conforme PNI (Programa Nacional de Imunizações).  
De acordo com esse quadro, a conduta a ser tomada corresponde corretamente à alternativa:  
A. ( ) Internação hospitalar para uso de antibióticos endovenosos.  
B. ( ) Evitar a vacinação contra Rotavírus.  
C. ( ) Prescrever fórmula láctea extensamente hidrolisada.  
D. ( ) Trocar o leite para fórmula de soja.
2. Em relação às características da dermatite atópica, podem ser feitas as afirmações das alternativas a seguir, exceto a da alternativa:  
A. ( ) Apresenta critérios diagnósticos maiores como prurido, distribuição típica e histórico familiar.  
B. ( ) A corticoterapia sistêmica deve ser evitada pela possibilidade de efeitos colaterais.  
C. ( ) A antibioticoterapia não está indicada nos casos de infecções secundárias de pele.  
D. ( ) Para os casos refratários ao tratamento estão indicados imunossuppressores sistêmicos.
3. Menina de 4 anos é levada pelo pai ao posto de saúde próximo a sua casa por episódios de diarreia aquosa e fétida há 2 dias, associada à febre. Teve apenas 1 episódio de vômito. Pai nega outros sintomas. Exame físico: hidratada, um pouco prostrada, palidez cutânea.  
Mediante o quadro descrito acima, assinale a alternativa que contém corretamente a melhor conduta a ser adotada frente a esse caso.  
A. ( ) Prescrição de sulfametoxazol + trimetoprim via oral.  
B. ( ) Solicitar exames laboratoriais como hemograma, PCR, EQU e coprocultura.  
C. ( ) Encaminhar ao pronto atendimento para hidratação venosa.  
D. ( ) Orientações ao pai quanto à evolução natural da doença e sinais de alerta; suplementar zinco e sintomáticos; alta para casa e afastar da creche.
4. Quanto à tuberculose em crianças no Brasil, classifique as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F). Após, marque a alternativa que corresponde à correta sequência das letras, de cima para baixo.  
( ) Na criança com mais de 2 anos, o conceito de teste tuberculínico reator é um valor maior ou igual a 5 mm.  
( ) Na criança menor que 2 anos, é considerado não reator um resultado menor que 10mm.  
( ) O RX de tórax não é um exame de grande importância, na medida em que muitos casos são assintomáticos.  
( ) A forma mais comum de TB extrapulmonar em crianças é a TB ganglionar periférica.  
A. ( ) V, V, V, V  
B. ( ) F, V, F, V  
C. ( ) V, V, F, V  
D. ( ) V, V, V, F



5. Lactente de 1 ano e 6 meses, sexo masculino, levado à UBS por história de febre nos últimos 3 dias, hoje iniciou uma erupção maculopapular que inicialmente se manifestou no tronco e se disseminou por todo o corpo. Ao exame físico encontra-se afebril, em bom estado geral, sem outros achados.  
O diagnóstico mais provável para esse quadro está descrito corretamente na alternativa:  
A. ( ) Escarlatina.  
B. ( ) Exantema súbito.  
C. ( ) Doença mão-pé-boca.  
D. ( ) Rubéola.
6. Lactente de 3 meses é levada ao pronto atendimento com quadro de febre há 24 horas, prostração, um episódio de vômito, mamando com menos frequência no seio materno. Ao exame físico apresenta: FC 130bpm, FR 30 ipm, PA 80x 50mmHg e temperatura axilar de 38°C. Está alerta, mas um pouco chorosa. No EQU encontram-se 20-30 leucócitos por campo com nitritos positivo.  
Considerando a descrição acima, marque a alternativa que responde corretamente à seguinte pergunta: Qual a conduta mais adequada em relação a esse bebê?  
A. ( ) Internação hospitalar e administração de cefalosporina de 3ª geração.  
B. ( ) Internação hospitalar e administração de quinolonas de 2ª geração.  
C. ( ) Tratamento ambulatorial com amoxicilina via oral.  
D. ( ) Tratamento ambulatorial com cefalosporina por via oral.
7. Durante uma consulta de puericultura, a mãe de um bebê lactante de 4 meses, alimentado com aleitamento materno exclusivo, afirma que voltará a trabalhar após o término da licença maternidade e questiona o médico sobre a conduta mais adequada para alimentá-lo enquanto estiver fora de casa.  
Nesse caso, deve ser indicada a medida descrita corretamente na alternativa:  
A. ( ) Oferecer fórmula infantil para lactentes de 0-6 meses de vida.  
B. ( ) Esgotar leite materno e armazenar na geladeira por até 12 horas em temperatura de no máximo de 5°C.  
C. ( ) Congelar o leite esgotado em frasco plástico e armazenar por até 1 mês no congelador.  
D. ( ) Levar o bebê ao trabalho junto para quando der fome amamentá-lo ao seio.
8. Criança de 10 anos chega à UPA com quadro de febre, dor de cabeça e vômitos. Ao exame apresenta-se prostrada, febril (39°C), pálida, taquipneica, sonolenta e inapetente. O exame de líquido evidencia a presença de 800 leucócitos por campo, com 100% de polimorfonucleares. A conduta inicial mais adequada para essa criança é a disposta corretamente na alternativa:  
A. ( ) Aguardar o resultado da hemocultura e cultura do líquido para decidir o tratamento.  
B. ( ) Iniciar tratamento imediato com vancomicina, pois a maioria das meningites são ocasionadas por bactérias gram positivas.  
C. ( ) Recomenda-se iniciar uma cefalosporina de terceira geração endovenosa.  
D. ( ) Iniciar antifúngico EV pensando em uma meningite asséptica.
9. Recém-nascido, de 20 dias de vida, iniciou febre de 38°C há 12 horas, nascido a termo, pré-natal sem intercorrências, apenas tratamento para infecção urinária no início da gestação tratada com amoxicilina. A conduta mais adequada para esse bebê corresponde de forma correta à alternativa:  
A. ( ) Internar, coletar hemograma, hemocultura, urocultura e RX tórax.  
B. ( ) Internar, coletar hemograma, hemocultura, urocultura, RX tórax, líquido e iniciar antibiótico endovenoso.  
C. ( ) Monitorar curva térmica, administrar antitérmico e, se não repetir febre, liberar para casa.  
D. ( ) Aliviar roupas, dar um banho morno e monitorar a curva térmica.



10. Considere a seguinte situação e, a seguir, marque a alternativa correta.  
Você é o pediatra de uma unidade de pronto atendimento e chega um lactente com quadro de desidratação de segundo grau, pouca aceitação ao seio materno, pouca diurese, diarreia e choroso. No exame físico percebem-se mucosas secas, palidez cutânea, taquicardia. Na sérico resultou em 165mEq/L. No dia seguinte, após hidratação vigorosa, o sódio baixou para 145 mEq/L, porém o mesmo evoluiu com convulsões, que provavelmente sejam causadas por:
- A. ( ) Edema cerebral.
  - B. ( ) Hiponatremia.
  - C. ( ) Hipernatremia.
  - D. ( ) Meningoencefalite.
11. Uma gestante de 20 anos, 40 semanas, primigesta, faz pré-natal na UBS onde você trabalha e descobriu, através dos exames, que é soropositiva para HIV no início da gestação. Faz uso de tratamento antirretrovirais com boa adesão e possui carga viral indetectável. Os cuidados que se deve ter com a gestante e seu recém-nascido correspondem às alternativas a seguir, exceto o disposto na alternativa:
- A. ( ) Dar banho já em sala de parto.
  - B. ( ) Uso de antirretroviral no parto.
  - C. ( ) Iniciar ARV nas primeiras 4 horas de vida do RN.
  - D. ( ) Parto normal, independentemente da carga viral materna.
12. Um lactente com 9 meses de vida, previamente hígido, história familiar de atopia negativa, que frequenta escola de educação infantil, foi internado na enfermaria pediátrica com quadro de tosse, sibilância e obstrução nasal. No quarto dia de internação, apesar da melhora do padrão respiratório, evoluiu com febre e irritabilidade. A principal complicação da bronquiolite é a descrita de forma correta na alternativa:
- A. ( ) Otite média aguda.
  - B. ( ) Pneumonia.
  - C. ( ) Sinusite.
  - D. ( ) Laringite estridulosa.
13. Criança com 1 ano e 6 meses, chorosa durante o sono, teve um quadro de síndrome gripal há cerca de uma semana e iniciou episódios recorrentes de febre alta. Coletou teste COVID e influenza A negativos. A única alteração aparente no exame físico é hiperemia e abaulamento da membrana timpânica direita. A conduta inicial, nesse caso, é a citada de forma correta na alternativa:
- A. ( ) Prescrição de medicações sintomáticas e observação clínica domiciliar.
  - B. ( ) Tratamento com azitromicina por 5 dias.
  - C. ( ) Usar amoxicilina em dose alta por 10 dias.
  - D. ( ) Tratamento com amoxicilina + clavulanato por 10 dias.
14. Lactente de 6 meses de vida torna-se suscetível a diferentes situações de risco mais comumente, como as citadas corretamente na alternativa:
- A. ( ) Riscos de choque elétrico, afogamento, intoxicação, ingestão de corpo estranho.
  - B. ( ) Ferimentos com objetos cortantes, mordeduras de animais.
  - C. ( ) Quedas de escadas, bordas de mobiliários, intoxicação por produtos de limpeza.
  - D. ( ) Asfixia com lençóis, prendedores de chupeta, quedas de trocadores.



15. Em relação ao diagnóstico de Síndrome Nefrótica, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, marque a alternativa correta.
- As indicações de biópsia renal na Síndrome Nefrótica constam idade menor que um ou maior que dez anos, hematuria macroscópica, hipertensão arterial, insuficiência renal e valores do complemento C3 baixo ou proteinúria persistente por mais de 4 semanas.
  - A suspeita de Síndrome Nefrótica se faz em crianças com edema periorbital, ganho de peso e urina espumosa em uma criança com pouco ou nenhum comprometimento do estado geral.
  - Os achados clássicos da Síndrome Nefrótica são: proteinúria nefrótica ( $> 50 \text{ mg/kg/dia}$ ,  $40\text{mg/m}^2/\text{hora}$  ou relação proteína/creatinina urinárias  $>2$ ), hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia.
- A.  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
B.  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
C.  Apenas a afirmativa II é verdadeira.  
D.  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
16. Marque a alternativa que responde corretamente à questão abaixo.  
Em relação à quebra do sigilo, contrariando o preceito da privacidade da adolescência, em qual situação o pediatra poderá rompê-lo?
- A.  Prescrição de anticoncepcional.  
B.  Relações sexuais.  
C.  Ideias suicidas.  
D.  Uso de drogas.
17. Em relação às imunizações, analise as afirmações abaixo e, após, marque a alternativa correta.
- As reações adversas locais da vacina DPT são dor e eritema local. As reações sistêmicas são, na sua maior parte, causadas pelo componente *pertussis*.
  - A presença de febre pós-vacinal ocorre geralmente nas primeiras 24 horas e contraindica doses subsequentes.
  - A síndrome hipotônica hiporresponsiva (SHH), caracterizada por hipotonia, sudorese fria e diminuição da resposta a estímulos, ocorre nas primeiras 48 horas; indica a substituição da DPT pela DTPa nas vacinações subsequentes.
- A.  Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
B.  As afirmativas I, II e III estão corretas.  
C.  Apenas a afirmativa I está correta.  
D.  Apenas a afirmativa III está correta.
18. Um bebê de 9 meses é levado pela mãe a uma consulta de puericultura. A mãe reclama ao pediatra que ele ainda não segura objetos com firmeza e quer saber se há atraso no desenvolvimento do filho. Uma característica motora fina dessa idade está descrita de forma correta na alternativa:
- A.  Pinça de dois dedos com o polegar.  
B.  Pinça de quatro dedos com o polegar.  
C.  Pinça radial.  
D.  Transferência de objetos de uma mão para outra.
19. Em relação à estratégia “Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância” (AIDPI), assinale a alternativa incorreta.
- A.  Foi desenvolvida originalmente pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que teve início no Brasil no ano de 1987.  
B.  Caracteriza-se pela consideração simultânea e integrada do conjunto de doenças de maior prevalência na infância.  
C.  Trata-se de importante estratégia para a identificação de sinais de risco e qualificação da atenção e manejo integrado das principais doenças e agravos à saúde infantil.  
D.  Apresenta um conjunto de medidas de avaliação da criança quanto a sinais clínicos de perigo/risco relacionados a essas doenças, sua classificação da gravidade e tratamento precoce.



20. São fatores de risco para asma fatal, exceto o fator citado na alternativa:
- A. ( ) História prévia de asma quase fatal requerendo intubação ou ventilação mecânica.
  - B. ( ) Três ou mais visitas a serviço de emergência ou dois ou mais hospitalizações no ano anterior.
  - C. ( ) Uso frequente de broncodilatador inalado de curta ação (salbutamol, fenoterol), com consumo de mais de um frasco por mês.
  - D. ( ) Necessidade de uso adequado de corticosteroide inalado.
21. Paciente do sexo feminino, previamente hígida, chega ao consultório do pediatra com 3 anos e 11 meses, para consulta de rotina. Medidas antropométricas: peso: 16kg (Z score=0), estatura 105cm (Z score entre 0 e +1), IMC: 14,51kg/m<sup>2</sup> (Z score entre 0 e -1). Assinale a alternativa que indica de forma correta como será sua classificação de estado nutricional de acordo com: as medidas de peso para a idade; IMC para idade; estatura para idade, respectivamente.
- A. ( ) Peso adequado para idade; magreza; baixa estatura para idade.
  - B. ( ) Peso adequado para idade; eutrofia; estatura adequada para idade.
  - C. ( ) Baixo peso para idade; magreza; estrutura adequada para idade.
  - D. ( ) Baixo peso para idade; eutrofia; baixa estatura para idade.
22. São indicadores de risco para deficiência auditiva:
- I. História familiar de perda auditiva neurossensorial na infância.
  - II. Infecções congênitas (TORCHS).
  - III. Permanência em UTI neonatal por dois ou mais dias.
- Marque a alternativa correta de acordo com os indicadores referidos.
- A. ( ) Somente o item III é falso.
  - B. ( ) Somente o item II é verdadeiro.
  - C. ( ) Somente os itens II e III são verdadeiros.
  - D. ( ) Os itens I, II e III são verdadeiros.
23. Sobre a Síndrome Hemolítico Urêmica (SHU), assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.
- ( ) É uma microangiopatia trombótica, definida pela ocorrência simultânea de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiência renal aguda.
  - ( ) SHU causada por *E. Coli* produtora de toxina Shiga (STEC-SHU) é responsável por mais de 90% dos casos de SHU na infância.
  - ( ) A insuficiência renal aguda (IRA) é leve em mais de 70% dos casos, sendo que somente 10% dos pacientes evoluem para IRA grave.
  - ( ) O *Streptococcus pneumoniae* é responsável por 5-15% dos casos de SHU na infância.
- A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa:
- A. ( ) F-V-F-F
  - B. ( ) F-V-F-V
  - C. ( ) V-V-F-V
  - D. ( ) V-F-F-V
24. Assinale a alternativa que responde corretamente à questão acerca do quadro descrito a seguir. Mãe leva filho de 5 anos na UBS com quadro de diarreia e febre. Durante a consulta, a pediatra identifica equimoses em ambos os braços, o que levanta a suspeita de maus-tratos. Diante desse caso, qual a conduta a ser tomada?
- A. ( ) Realizar exame físico, acionar Conselho Tutelar e encaminhar a criança para atendimento hospitalar, se necessário.
  - B. ( ) Realizar exame físico, acionar polícia e encaminhar criança para atendimento hospitalar.
  - C. ( ) Fazer boletim de ocorrência no local e encaminhar a criança para o IML para coleta de provas o mais rápido possível.
  - D. ( ) Agendar um retorno com o pai para verificar com mais detalhes a história.

25. Uma criança de 15 meses chega ao pronto atendimento com quadro de tosse, dispneia intensa e estrido. Há 4 dias vinha com quadro gripal, mas a tosse piorou muito nas últimas 24 horas, juntamente com o aparecimento de febre alta e estridor. Ao exame físico: taquipneico, tiragem subcostal e supraesternal. Não apresentou melhora com nebulização com epinefrina. A hipótese diagnóstica mais provável nesse caso é a da alternativa:
- A.  Laringotraqueíte bacteriana.
  - B.  Laringite viral.
  - C.  Laringite estridulosa.
  - D.  Epiglotite aguda.

## **L**egislação

26. O Artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís trata das competências do município, no exercício de sua autonomia administrativa. Dentre as competências arroladas abaixo, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas e, no final, marque a alternativa que corresponde à sequência correta das letras de cima para baixo.
- Legislar sobre assuntos de interesse local.
  - Organizar-se administrativamente com base na legislação de outros municípios de igual porte.
  - Organizar os quadros e estabelecer o Regime Jurídico de seus Servidores.
  - Legislar sobre os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso particular.
- A.  V, V, F, F.
  - B.  V, F, V, F.
  - C.  F, F, V, V.
  - D.  F, V, F, V.
27. Sobre o Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís estabelece que, dentre outros, deve:
- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
  - II. Sempre que possível promover formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino de 1º grau (Ensino Fundamental).
  - III. Destinar o montante de dez por cento do orçamento anual para as despesas em saúde, computadas as transferências constitucionais.
  - IV. Manter, dentro de suas possibilidades, equipamento móvel para o atendimento médico, odontológico e farmacêutico das comunidades do interior.
- Após a análise das afirmativas supra, marque a única alternativa correta.
- A.  Estão corretas somente as afirmativas I e II.
  - B.  Estão corretas somente as afirmativas III e IV.
  - C.  Todas as afirmativas estão incorretas.
  - D.  Todas as afirmativas estão corretas.



28. Com referência ao novo plano de cargos e salários (Lei 3.610/2022), leia as afirmativas abaixo colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. Após, marque a alternativa correspondente à sequência correta das letras, de cima para baixo.
- ( ) O plano instituído por essa Lei obedece em parte ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos estabelecido no âmbito municipal, e aplica-se àqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo do Município, excetuados os ocupantes do Quadro de Servidores da Saúde, disciplinado em Lei específica.
  - ( ) O sistema de carreiras no Serviço Público Municipal atenderá às diretrizes estabelecidas pelo presente diploma legal, oportunizando aos seus membros condições de desenvolvimento e qualificação profissionais, em consonância com os princípios e fins da administração pública municipal.
  - ( ) O quadro de cargos e funções do Poder Executivo Municipal é integrado por:
    - I - quadro dos cargos de provimento efetivo, constituído por três grupos: cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível superior;
    - II - quadro de gratificações;
    - III - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
  - ( ) Por essa Lei, entende-se como cargo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo, retribuição pecuniária padronizada, escolaridade e carga horária.
- A. ( ) V, V, F, F.  
B. ( ) F, V, V, V.  
C. ( ) F, V, F, V.  
D. ( ) F, F, V, V.
29. Conforme os artigos 39/40 do Plano de Cargos e Salário da Prefeitura de Entre-Ijuís, o programa de qualificação dos servidores municipais, titulares de cargos de provimento efetivo e em comissão tem como objetivo promover a sua capacitação e aperfeiçoamento, visando a um melhor desempenho de suas funções.
- Para a implementação desse programa, a Administração Municipal:
- I. Oportunizará treinamentos, seminários e congressos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
  - II. Autorizará ou determinará o afastamento do servidor, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de treinamentos, seminários e congressos realizados nas suas respectivas áreas de atuação.
  - III. Auxiliará na aquisição de livros e materiais necessários para a qualificação dos servidores, desde que existente pertinência entre o tema e as funções que exerce o servidor.
  - IV. Auxiliará nas despesas com transporte, estadia e alimentação, quando for o caso, nos moldes definidos em lei específica.
- Após a análise das afirmativas supra, marque a única alternativa que representa a resposta certa.
- A. ( ) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.  
B. ( ) Estão corretas somente as afirmativas I e II.  
C. ( ) Estão corretas somente as afirmativas II e IV.  
D. ( ) Nenhuma das afirmativas está correta.
30. O Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Entre-Ijuís, Lei 3036/2018, assim dispõe: “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação conduzida por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos”, dentre outros.
- Após a análise do texto acima e as alternativas abaixo, marque a única incorreta.
- A. ( ) Assiduidade.  
B. ( ) Pontualidade.  
C. ( ) Liderança.  
D. ( ) Disciplina.