



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍ

CARGO

ODONTÓLOGO – 20H

5.3.2023

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação 5 questões

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME

Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. A organização do cuidado à saúde na Atenção Básica (AB) tornou-se um eixo estratégico que reorientou o modelo assistencial no SUS. Nesse sentido, um conjunto de ações, descritas na Política Nacional de Atenção Básica, são integradas nas equipes de saúde e, no campo de atenção à saúde bucal, devem ser dirigidas à população.
Qual das seguintes alternativas atende corretamente ao preconizado na AB?
 - A. () Ações intersetoriais, ações educativas, ações de promoção à saúde e ações de assistência.
 - B. () Ações intersetoriais, ações exclusivas para a saúde do adulto, ações de promoção à saúde e ações de assistência.
 - C. () Ações colaborativas, ações do modelo biomédico, ações de promoção à saúde e ações de assistência.
 - D. () Empoderamento das famílias através da visita domiciliar que é a principal missão elegida aos agentes comunitários de saúde.
2. Através da Política Nacional da Atenção Básica, a Atenção Básica (AB) é considerada a principal porta de entrada do usuário no SUS e se configura como centro de comunicação com as RAS (Redes de Atenção em Saúde).
Qual das seguintes alternativas está incorreta quanto aos princípios ou diretrizes operacionalizados na AB?
 - A. () Universalidade, Territorialização, Resolutividade, Coordenação do cuidado.
 - B. () Equidade, Cuidado centrado na pessoa, Ordenação da rede.
 - C. () Igualdade, Integralidade, Regionalização e Hierarquização.
 - D. () Integralidade, Longitudinalidade do cuidado, Participação da comunidade.
3. Quanto à indicação de solução concentrada de enxaguatórios bucais para bochechos, qual é a concentração de solução fluoretada prescrita corretamente para bochechos diários?
 - A. () NaF a 0,05% (solução de Fluoreto de Sódio a 0,05%).
 - B. () NaF a 0,5% (solução de Fluoreto de Sódio a 0,5%).
 - C. () NaF a 0,02% (solução de Fluoreto de Sódio a 0,02%).
 - D. () NaF a 2% (solução de Fluoreto de Sódio a 2%).
4. Para uma adequada adesão dos compósitos à estrutura dental é necessário seguir à risca uma série de passos cada qual com a sua função. Com base nisso, qual a sequência clínica correta para uma restauração de resina composta?
 - A. () Condicionamento ácido; isolamento do campo operatório; aplicação do primer e/ou adesivo; fotoativação; inserção da resina composta; fotopolimerização.
 - B. () Isolamento do campo operatório; condicionamento ácido; aplicação do primer e/ou adesivo; inserção da resina composta; fotoativação; fotopolimerização.
 - C. () Fotoativação; isolamento do campo operatório; condicionamento ácido; aplicação do primer e/ou adesivo; inserção da resina composta; fotopolimerização.
 - D. () Isolamento do campo operatório; condicionamento ácido; aplicação do primer e/ou adesivo; fotoativação; inserção da resina composta; fotopolimerização.

5. A cárie dentária é uma das doenças mais antigas e prevalentes na população. Na cariologia, ciência que estuda os mecanismos da cárie, ela pode ser caracterizada como resultado do desequilíbrio de um processo des-re (desmineralização e remineralização) na cavidade bucal. O fenômeno de dissolução mineral acontece em meio ácido provocado por um pH (potencial de hidrogênio) crítico menor que 6,7 para dentina e menor que 5,5 para o esmalte dentário. Todo esse processo é decorrente do acúmulo de bactérias sobre os dentes e da exposição frequente aos açúcares fermentáveis. Quando nos valem de medidas preventivas na odontologia com o uso de fluoretos e outras formas de exposição ao flúor, há uma redução no risco de cárie devido a um efeito protetor. Qual o valor do pH crítico para o esmalte dentário quando existe fator de proteção do flúor?
- A. () 5,5
B. () 4,5
C. () 6,7
D. () 3,5
6. Segundo LINDHE (2005), o uso de antissépticos na terapia periodontal é eficaz para o controle do biofilme. Diante disso, analise as afirmações e marque a alternativa correta.
- I. Alguns dos efeitos colaterais locais da Clorexidina incluem manchas extrínsecas nos dentes, principalmente quando utilizada por longos períodos, e alteração no paladar.
II. O antisséptico Clorexidina tem uma importante ação antimicrobiana, incluindo uma ampla variedade de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, Anaeróbicos, Fungos e Vírus.
III. Os óleos essenciais como o Listerine são antissépticos de primeira escolha em tratamento periodontal uma vez que são considerados padrão-ouro para controle químico do biofilme.
- A. () São verdadeiras somente as afirmações I e II.
B. () São verdadeiras as afirmações I, II e III.
C. () É verdadeira somente a afirmação II.
D. () É verdadeira somente a afirmação III.
7. Um paciente de 25 anos procura o serviço odontológico e no exame apresenta um aumento de volume indolor intrabucal, na região vestibular do corpo mandibular direito, à altura do segundo e terceiro molares. Através do exame radiográfico, é possível perceber uma imagem radiotransparente multilocular de bordas irregulares, com finas trabéculas de osso arranjadas em ângulo reto, que medem, aproximadamente, 3 cm em seu maior diâmetro. O paciente foi submetido à biópsia e a característica do espécime era de estrutura gelatinosa. Microscopicamente, a lesão é constituída de células arredondadas, fusiformes e estreladas, dispostas em um abundante estroma mixóide frouxo, que contém poucas fibrilas colágenas e algumas pequenas ilhas dispersas de epitélio odontogênico. Considerando-se o quadro descrito acima, qual é o provável diagnóstico dessa lesão?
- A. () Ameloblastoma.
B. () Granuloma central de células gigantes.
C. () Mixoma odontogênico.
D. () Tumor odontogênico adenomatóide.
8. Relacione a sequência correta, considerando as seguintes características: média de idade, localização mais frequente, e aspecto radiográfico dos principais tumores odontogênicos.
- | | |
|---|-------------------------------|
| a - 20 anos em homem; região posterior da mandíbula ou anterior da maxila. | 1 - Cisto Periodontal Lateral |
| b - 18 anos; região dos terceiros molares, pré-molares e caninos; radiolúcido com envolvimento da coroa do dente. | 2 - Cisto Dentífero |
| c - 50 anos; região entre caninos e pré-molares; radiolúcido. | 3 - Ceratocisto |
- A. () a=3; b=2; c=1
B. () a=1; b=2; c=3
C. () a=2; b=3; c=1
D. () a=3; b=1; c=2

9. As afirmativas abaixo referem-se às técnicas de obtenção de exames radiográficos em Odontologia. Em qual das alternativas a afirmativa está incorreta?
- A. () A técnica interproximal ou *bite-wing* está indicada como exame radiográfico das faces proximais de dentes posteriores para a pesquisa de cárie dental.
 - B. () A técnica interproximal ou *bite-wing* está indicada para identificar excesso ou falta de material restaurador e exame da crista óssea alveolar para a pesquisa de reabsorção, indicativa de doença periodontal.
 - C. () A técnica da radiografia intraoral oclusal possibilita avaliação de grandes áreas patológicas na maxila ou mandíbula que não são observadas inteiramente em exame periapical.
 - D. () A técnica periapical da bisettriz exige um posicionamento correto do paciente, das angulações vertical e horizontal; porém, devido à facilidade de obtenção e estar menos suscetível a erros, dispensa o uso de posicionadores.
10. O preparo cavitário é um dos procedimentos operatórios mais executados para remover tecido cariado dos elementos dentais. A padronização das cavidades permite identificar o local da lesão e classificar as situações clínicas. Qual das seguintes alternativas apresenta classificação incorreta?
- A. () Classe I: refere-se às lesões ou cavidades localizadas em regiões de cicatrículas e fissuras presentes nas faces oclusais de pré-molares e molares.
 - B. () Classe IV: refere-se a lesões ou cavidades que envolvem a face proximal de um dente anterior e que compromete pelo menos um ângulo incisal.
 - C. () Classe V: são as lesões que envolvem a face oclusal de caninos e pré-molares sem envolver as faces proximais.
 - D. () Classe III: são lesões ou cavidades que envolvem uma ou ambas as faces proximais de incisivos e caninos sem comprometer o ângulo incisal.
11. Segundo MALAMED (2013), quanto à aplicação de anestesia local, o bloqueio do nervo alveolar inferior que inerva a mandíbula é possivelmente a técnica de injeção mais importante em odontologia. Para qual indicação essa técnica está incorreta?




MALAMED, S.F; Manual de anestesia local (tradução Fernando Mundim...et al.) 6ª edição/ Editora Elsevier, 2013.

- A. () Quando é necessária a anestesia do tecido mole lingual.
- B. () Quando o tratamento envolve dois ou mais molares superiores.
- C. () Procedimentos em vários dentes inferiores em um quadrante.
- D. () Quando é necessária a anestesia dos tecidos moles vestibulares (anteriores ao forame mental).

12. As fraturas coronárias e luxações são as lesões dentárias traumáticas mais comuns. E acontecem com certa frequência em crianças e adultos jovens. A necessidade de desenvolver diretrizes para instrumentar a tomada de decisão clínica foi o que motivou a IADT (*International Association of Dental Traumatology*) em desenvolver um documento consensual de manejo e tratamento das lesões dentárias traumáticas. Após o diagnóstico da lesão é possível estabelecer um prognóstico, favorável ou desfavorável ao tratamento para manutenção do elemento dental. Com base nas diretrizes da IADT, qual das alternativas é prognóstico desfavorável para as fraturas corono-radiculares com exposição pulpar?


Fraturas corono-radiculares com exposição pulpar



Diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária para a abordagem de lesões dentárias traumáticas: 1. Fraturas e luxações de dentes permanentes, encontrado em https://www.iadt-dentaltrauma.org/IADT_Guidelines_Portuguese_Diretrizes_Traducao_IADT_1.pdf

- A. () Presença de sintomatologia (dor), resposta pulpar negativa e sinais de lesão periapical.
B. () Ausência de sintomatologia (dor), resposta pulpar positiva e continuidade da ausência de sintomas nas consultas de acompanhamento.
C. () Indicação de terapia endodôntica e continuidade da ausência de sintomas nas consultas de acompanhamento.
D. () Fratura envolvendo esmalte, dentina e ou cemento.
13. Um paciente, homem de 53 anos, sedentário, com IMC (índice de massa corporal) de 35, (obesidade grau II), procura o serviço de odontologia para exodontia de raízes residuais do elemento dentário 46. Após o exame anamnésico do paciente é feita a aferição da pressão arterial sistêmica e percebe-se que o paciente apresenta 180/110 mmHg. O paciente relata dor de cabeça severa e dispneia. Qual a classificação de risco desse paciente?
- A. () Hipertensão severa. O paciente deve ser encaminhado para consulta médica.
B. () Urgência hipertensiva. O paciente precisa de acompanhamento médico ambulatorial com o uso de anti-hipertensivos de ação rápida.
C. () Emergência hipertensiva. Disfunção orgânica ameaçadora à vida do paciente. A internação hospitalar é necessária e medicamentos devem ser administrados por via intravenosa aliados a outras medidas de suporte em ambiente hospitalar.
D. () Síndrome do jaleco branco. Devido à elevação da pressão por medo do tratamento, pode-se fazer o manejo e realizar o procedimento cirúrgico.
14. A anestesia do paciente faz parte do protocolo de atendimento clínico, em especial quando o procedimento é mais invasivo. A superdosagem de soluções anestésicas locais pode se dar por volume excessivo de solução anestésica injetada, acidentalmente ao injetar intravascular a solução ou ainda injetar de forma muito rápida. Entre as alternativas para se evitar as reações adversas, qual delas não está correta?
- A. () Anamnese criteriosa em pacientes com fatores de risco (gravidez ou portadores de doenças sistêmicas).
B. () Usar sempre que possível soluções anestésicas com vasoconstritor, que diminui a velocidade de absorção do anestésico e aumenta o tempo da anestesia.
C. () Nos bloqueios regionais fazer a aspiração prévia à injeção da solução.
D. () Fazer injeções repetidas e complementares na técnica adequada à anatomia do paciente.

15. A classificação de estado físico do paciente e risco cardiovascular é determinado pela ASA (*American Society of Anesthesiologists*). Em pacientes com um comprometimento cardiovascular, é prudente limitar ou evitar a exposição a vasoconstritores. Os vasoconstritores estão presentes na estrutura química de vários anestésicos locais de uso odontológico e o profissional pode escolher entre usar um anestésico com ou sem vaso constritor. De acordo com o estado clínico do paciente, qual das seguintes alternativas não configura contraindicação ao uso de anestésico com vasoconstritor? (Observação: Inibidores da MAO (monoamina oxidase) são psicofármacos com finalidade terapêutica para transtornos psiquiátricos.)
- A. () Pacientes com doença cardiovascular mais significativa (classes 3 e 4 da ASA).
B. () Pacientes diabéticos compensados que fazem uso de fármacos anti-hiperglicemiantes orais.
C. () Pacientes com determinadas doenças não cardiovasculares (disfunção da tireoide, diabetes, sensibilidade a sulfitos).
D. () Pacientes que recebam inibidores da MAO (monoamina oxidase), antidepressivos tricíclicos e fenotiazinas.
16. Para os casos de cirurgia oral, o acesso à área cirúrgica é essencial e o procedimento para se realizar uma incisão nos tecidos segue alguns princípios básicos. Qual das seguintes alternativas apresenta um princípio básico e sua correta justificativa?
- A. () Um princípio básico das incisões é a preservação de estruturas importantes. O acidente em uma incisão é inevitável, mesmo com o devido conhecimento das áreas anatômicas do paciente.
B. () O princípio básico de uma incisão é que ela deve ser firme e descontínua. Repetições e tentativas de incisar não aumentam a quantidade de dano tecidual e de sangramento em uma ferida cirúrgica.
C. () O princípio básico de uma incisão é o uso de lâmina afiada de tamanho e forma adequados. Uma lâmina afiada possibilita que o cirurgião faça as incisões com precisão, sem causar lesões desnecessárias por movimentos repetitivos.
D. () Um princípio é que as incisões na cavidade bucal devem ser bem posicionadas. Incisões em gengivas inseridas e sobre ossos saudáveis não são mais desejáveis que aquelas em gengivas não inseridas e em ossos doentes e ausentes.
17. Um paciente de 55 anos procura o serviço de odontologia com a queixa de um pequeno edema em gengiva em área vestibular entre as raízes do canino e primeiro pré-molar inferior esquerdo. Reporta gosto salgado na boca provocado pelo conteúdo que sai desse pequeno edema. Pelo exame clínico é possível perceber presença de biofilme próximo ao colo dos dentes inferiores. Existe ausência de cáries ou restauração nos dentes envolvidos, porém na sondagem periodontal percebe-se uma bolsa periodontal profunda do lado lingual do canino. Os dentes envolvidos respondem positivamente ao teste de vitalidade pulpar. Como tem uma fístula ativa, é possível mapear com o uso de cone de guta-percha e realizar exame de raio-x periapical, demonstrado nas imagens A e B.



LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N.P. Periodontologia clínica e implantologia odontológica – 4ª edição/ Editora Guanabara Koogan S.A., 2005.


Qual o provável diagnóstico desta lesão?

- A. () Cisto periapical lateral.
B. () Fratura vertical radicular.
C. () Lesão periapical endodôntica.
D. () Abscesso periodontal associado ao dente canino inferior.

18. O tratamento endodôntico clínico preconiza uma série de procedimentos com o objetivo de prevenir e tratar a contaminação microbiana presente na polpa ou nos sistemas de canais radiculares do paciente. Um desses procedimentos é a limpeza e modelagem dos canais. Qual alternativa não é um objetivo básico de limpeza e preparo dos canais radiculares em tratamento endodôntico?

- A. () Remover tecidos moles e duros infectados.
- B. () Obliterar o acesso de irrigantes desinfetantes ao espaço do canal apical.
- C. () Criar espaço para a administração de medicamentos e subsequente obturação.
- D. () Manter a integridade das estruturas radiculares.

19. O tratamento dos canais radiculares em odontologia é determinado por uma série de procedimentos clínicos preconizados dentro de técnicas específicas. O acesso à extensão de um canal radicular em direção ao periápice de um dente incisivo superior segue uma sequência operatória quando utilizamos instrumentos manuais. Qual alternativa apresenta a sequência correta?



COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Caminhos da Polpa (tradução por Alcir Costa Fernandes filho... et al.). Editora Elsevier, 2011

- A. () Irrigação, limas tipo K, brocas diamantadas, irrigação, brocas peeso, limas tipo K.
 - B. () Irrigação, limas tipo K, brocas peeso, irrigação, brocas diamantadas, limas tipo K.
 - C. () Irrigação, limas tipo K, brocas Gates-Glidden, irrigação, brocas Gates-Glidden, limas tipo K.
 - D. () Irrigação, limas tipo Gracey, brocas diamantadas, irrigação, brocas peeso, limas tipo Gracey.
20. O uso de antibióticos na clínica odontológica faz parte de tratamentos como medida complementar e tem sido empregado, historicamente, em prescrição pelo cirurgião-dentista por um período médio de 5 a 10 dias. O paciente é então instruído para tomar a medicação de forma contínua até completar o tratamento. Qual das alternativas apresenta melhor critério para decidir sobre o uso de antibióticos?
- A. () Edema local, rubor, presença de fístula próximo das raízes dentais afetadas com pouca dor ou sem sinais de fratura dental.
 - B. () Indicação de terapia endodôntica, limitação da abertura bucal, fratura completa do esmalte com ausência de sensibilidade à percussão.
 - C. () Cirurgia de raízes retidas, presença de edema, indicação de terapia endodôntica e fratura completa de esmalte e dentina, disfagia ou mal-estar geral.
 - D. () Presença de celulite (edema pronunciado), limitação da abertura bucal, linfadenite, febre, disfagia ou mal-estar geral.

21. Segundo o Ministério da Saúde a cárie é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo. Os levantamentos epidemiológicos realizados periodicamente no Brasil permitem identificar um elevado índice de cárie na população brasileira em todas as faixas etárias pesquisadas. Somente o tratamento restaurador da cavidade da cárie não garante o controle do processo da doença; portanto, é necessário intervir sobre os fatores de risco para evitar novas cavidades e ou recidivas nas restaurações.
Qual das alternativas apresenta os principais fatores de risco para a cárie dentária?
- A. () Xerostomia, consumo excessivo e frequente de açúcar, controle mecânico do biofilme deficiente, presença de placa bacteriana, falta de acesso ao flúor e fatores culturais e socioeconômicos.
 - B. () Consumo excessivo e frequente de açúcar, dieta rica em proteína, presença de minerais na saliva, controle mecânico do biofilme, fatores culturais e socioeconômicos.
 - C. () Uso de dentífrício, consumo excessivo e frequente de açúcar, dieta rica em carboidratos, controle mecânico do biofilme, fatores culturais e socioeconômicos.
 - D. () Acesso ao flúor, consumo excessivo de açúcar, dieta rica em carboidrato, controle químico do biofilme, presença de minerais na saliva, fatores culturais e socioeconômicos.
22. A abordagem individual do paciente é procedimento que pode ser conduzido para um bom diagnóstico dos problemas, determinação de prognóstico e eleição de tratamentos efetivos. Analise as afirmativas abaixo e, na sequência, marque a alternativa correta.
- I. O diagnóstico para identificação da lesão de cárie é visual, feito por meio de exame clínico e pode ser complementado com exames radiográficos.
 - II. As lesões restritas ao esmalte dentário devem ser monitoradas, os sulcos escurecidos devem ser monitorados e não têm indicação de remoção.
 - III. As lesões cavitadas em dentina sempre apresentam risco de exposição pulpar.
- A. () São verdadeiras as afirmativas I, II e III.
 - B. () São verdadeiras somente as afirmativas II e III.
 - C. () São verdadeiras somente as afirmativas I e II.
 - D. () São verdadeiras as afirmativas I e III.
23. A lógica de instalar Unidades Básicas de Saúde perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem faz parte da estratégia “Saúde mais perto de você”, que propõe o avanço da expansão da Atenção Básica no País.
Qual alternativa não apresenta fundamentos e diretrizes da Atenção Básica?
- A. () Coordenar a integralidade, integrando as ações programáticas e a demanda espontânea.
 - B. () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo entre as equipes e a população.
 - C. () Possibilitar acesso universal e contínuo a serviços de qualidade e resolutivos.
 - D. () Premiar usuários com a melhor iniciativa ético-política através do prêmio “melhor em casa”.
24. Os profissionais que integram a saúde bucal de equipes de Saúde da Família podem ser organizados em sua composição de três tipos de modalidades.
Em relação à afirmação acima, qual alternativa está incorreta?
- A. () Um cirurgião-dentista (CD) generalista ou CD especialista em Saúde da Família; um técnico em saúde bucal (TSB); e um auxiliar em saúde bucal (ASB).
 - B. () Um cirurgião-dentista (CD) generalista ou CD especialista em Saúde da Família; um técnico em saúde bucal (TSB); e um auxiliar em enfermagem.
 - C. () Unidade Odontológica Móvel com um cirurgião-dentista (CD) generalista ou CD especialista em Saúde da Família e um auxiliar em saúde bucal (ASB).
 - D. () Um cirurgião-dentista (CD) generalista ou CD especialista em Saúde da Família; um auxiliar em saúde bucal (ASB) e um técnico em saúde bucal (TSB); que operam em Unidade Odontológica Móvel.

25. Analise as afirmativas abaixo e, após, marque a alternativa correta.
- I. A Lei nº 8.080, ou Lei Orgânica da Saúde, versa sobre a organização do SUS e as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - II. A PNAB - Política Nacional da Atenção Básica estabelece diretrizes e normas para Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
 - III. A portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 estabelece as diretrizes para a política nacional de saúde bucal inclusive na estratégia de saúde da família.
 - IV. A Lei nº 8.080 trata do financiamento da saúde através de arrecadação de 15% sobre os impostos estaduais e 12% sobre os impostos municipais.
- A. () São verdadeiras as afirmativas I, II e IV e a III é falsa.
B. () São verdadeiras as afirmativas II, III e IV e a I é falsa.
C. () São verdadeiras as afirmativas, I, II, III e IV.
D. () É falsa a afirmativa IV e são verdadeiras as afirmativas I, II e III.

Legislação

26. O Artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís trata das competências do município, no exercício de sua autonomia administrativa. Dentre as competências arroladas abaixo, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas e, no final, marque a alternativa que corresponde à sequência correta das letras de cima para baixo.
- () Legislar sobre assuntos de interesse local.
 - () Organizar-se administrativamente com base na legislação de outros municípios de igual porte.
 - () Organizar os quadros e estabelecer o Regime Jurídico de seus Servidores.
 - () Legislar sobre os serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso particular.
- A. () V, V, F, F.
B. () V, F, V, F.
C. () F, F, V, V.
D. () F, V, F, V.
27. Sobre o Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica do Município de Entre-Ijuís estabelece que, dentre outros, deve:
- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 - II. Sempre que possível promover formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino de 1º grau (Ensino Fundamental).
 - III. Destinar o montante de dez por cento do orçamento anual para as despesas em saúde, computadas as transferências constitucionais.
 - IV. Manter, dentro de suas possibilidades, equipamento móvel para o atendimento médico, odontológico e farmacêutico das comunidades do interior.
- Após a análise das afirmativas supra, marque a única alternativa correta.
- A. () Estão corretas somente as afirmativas I e II.
B. () Estão corretas somente as afirmativas III e IV.
C. () Todas as afirmativas estão incorretas.
D. () Todas as afirmativas estão corretas.

28. Com referência ao novo plano de cargos e salários (Lei 3.610/2022), leia as afirmativas abaixo colocando V para as verdadeiras e F para as falsas. Após, marque a alternativa correspondente à sequência correta das letras, de cima para baixo.
- () O plano instituído por essa Lei obedece em parte ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos estabelecido no âmbito municipal, e aplica-se àqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo do Município, excetuados os ocupantes do Quadro de Servidores da Saúde, disciplinado em Lei específica.
 - () O sistema de carreiras no Serviço Público Municipal atenderá às diretrizes estabelecidas pelo presente diploma legal, oportunizando aos seus membros condições de desenvolvimento e qualificação profissionais, em consonância com os princípios e fins da administração pública municipal.
 - () O quadro de cargos e funções do Poder Executivo Municipal é integrado por:
 - I - quadro dos cargos de provimento efetivo, constituído por três grupos: cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível superior;
 - II - quadro de gratificações;
 - III - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
 - () Por essa Lei, entende-se como cargo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo, retribuição pecuniária padronizada, escolaridade e carga horária.
- A. () V, V, F, F.
B. () F, V, V, V.
C. () F, V, F, V.
D. () F, F, V, V.
29. Conforme os artigos 39/40 do Plano de Cargos e Salário da Prefeitura de Entre-Ijuís, o programa de qualificação dos servidores municipais, titulares de cargos de provimento efetivo e em comissão tem como objetivo promover a sua capacitação e aperfeiçoamento, visando a um melhor desempenho de suas funções.
- Para a implementação desse programa, a Administração Municipal:
- I. Oportunizará treinamentos, seminários e congressos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.
 - II. Autorizará ou determinará o afastamento do servidor, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de treinamentos, seminários e congressos realizados nas suas respectivas áreas de atuação.
 - III. Auxiliará na aquisição de livros e materiais necessários para a qualificação dos servidores, desde que existente pertinência entre o tema e as funções que exerce o servidor.
 - IV. Auxiliará nas despesas com transporte, estadia e alimentação, quando for o caso, nos moldes definidos em lei específica.
- Após a análise das afirmativas supra, marque a única letra que representa a resposta certa.
- A. () Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
B. () Estão corretas somente as afirmativas I e II.
C. () Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
D. () Nenhuma das afirmativas está correta.
30. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Entre-Ijuís, Lei 3036/2018, assim dispõem “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação conduzida por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos”, dentre outros:
- Após a análise do texto acima e as alternativas abaixo, marque a única incorreta.
- A. () Assiduidade.
B. () Pontualidade.
C. () Liderança.
D. () Disciplina.